



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation
et l'agriculture



MANGER LOCAL – AGIR GLOBAL

Burkina – France - Brésil

SITUATION NUTRITIONNELLE AU BURKINA FASO

Par Dr Prosper Sawadogo
FAO-BF , prosper.sawadogo@fao.org

Ouagadougou, 20- 23 Novembre 2019



Situation nutritionnelle au Burkina Faso

- Contexte d'analyse de la situation nutritionnelle
- Les prévalences des différents types de malnutrition
- Les implications au plan national

Contexte

Depuis près d'une décennie, le Burkina Faso a placé la nutrition parmi les priorités de santé publique.

- Renforcement des interventions de nutrition et mise en place d'un système de surveillance afin de mieux apprécier la situation nutritionnelle des enfants,
- Harmonisation depuis 2009 des sources de données sur la nutrition au Burkina Faso.

Divers besoins :

- Outil de surveillance à l'échelle provinciale, régionale et nationale.
- Outil d'aide à la planification à l'échelle des districts sanitaires, des régions et au plan national

Contexte

- Outil pour un meilleur ciblage des zones (province et région) à risques
- Appréciation des efforts des acteurs intervenant dans la promotion d'une bonne nutrition et de santé des enfants et des populations en général.
- Appréciation des performances en termes de couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë des DS, des DRS et au niveau national.
- ...

Prévalences de la malnutrition au BF, 2018

	Emaciation	Retard de croissance	Insuffisance pondérale
National	8,5	25,0	17,8
Boucle du Mouhoun	8,3	21,8	16,3
Cascades	6,1	27,1	12,2
Centre	8,6	7,3	9,3
Centre Est	7,4	26,4	17,3
Centre Nord	8,9	28,2	18,7
Centre Ouest	9,1	22,4	16,2
Centre Sud	5,8	19,6	12,3
Est	7,5	31,4	21,4
Hauts Bassins	6,3	21,5	12,2
Nord	9,0	24,8	21,0
Plateau Central	8,9	20,4	16,8
Sahel	12,6	42,2	31,3
Sud-Ouest	8,3	27,7	17,8

Prévalences de la malnutrition au BF, 2018

Tendance des différents types de malnutrition
2009 - 2018



Prévalences de la malnutrition au BF

7 femmes enceintes sur 10 souffrent de carences en fer

8 enfants de moins de 5 ans sur 10 souffrent de carences en fer

Prévalences de la malnutrition au BF, 2018

- 13,4% de la population âgée de 25 à 64 ans était en surpoids
- 4,5% de cette même population était obèse.
18.9 % en état de surcharge pondérale (STEP 2013)
- 23,9 % de surpoids en milieu urbain contre 11,3% en milieu rural
- 9,4% d'obésité en milieu urbain contre 1,9% en milieu rural.
- 33% de surcharge pondérale en milieu urbain contre 13% en rural.
- Pendant que 22,7% des femmes ont une obésité abdominale au plan national, 16% présentent un état de déficience énergétique chronique (ont un IMC inférieur à 18,5) mettant le BFA dans un état de double fardeau de la malnutrition.

Conclusion

Situation nutritionnelle plus ou moins en amélioration, il faut intensifier l'action.

Les politiques doivent prendre en compte le contexte réel de vie des populations

Définir des politiques Pro-Paysannes.

Par exemple pour la FAO, les stratégies de diversification au plan national (prenant en compte les questions agro-écologiques) à petite échelle (par ex. mises en œuvre au niveau des ménages ou des petites exploitations, principalement pour l'autoconsommation) peuvent contribuer à renforcer l'accès direct à des micronutriments et à des protéines de bonne qualité, qui, autrement, pourraient être coûteux ou difficiles à acquérir de façon durable, en particulier pour les personnes pauvres qui vivent dans des communautés reculées.